



TIMING – 3 MÅNADERSUPPFÖLNING

I samband med att du vårdades för stroke gav du ditt samtycke till att delta i TIMING-studien. Nedan följer två frågor som vi hoppas att du har möjlighet att besvara.

Stort tack för din medverkan!

- I. Sedan du skrevs ut från sjukhus efter din stroke, har du avslutat eller gjort uppehåll (mer än 36 timmar) i behandling med blodförtunnande läkemedel i tablettform (Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Rivaroxaban eller Waran)?

| | | = ja – avslutat behandling

| | | = ja – gjort ett eller flera uppehåll, men har återupptagit behandlingen

| | | = nej – fortsatt utan avbrott

- II. Har du varit sjukhusvårdad sedan du skrevs ut från sjukhuset efter din stroke?

| | | = ja, pga **Ny hjärninfarkt** vid sjukhus:.....

| | | = ja, pga **Hjärnblödning** vid sjukhus:.....

| | | = ja, pga **Magblödning** vid sjukhus:.....

| | | = ja, pga **Annan blödning** vid sjukhus:.....

| | | = ja, pga **Annan orsak** vid sjukhus:.....

**Skicka in dina svar tillsammans med
Riksstroke ordinarie formulär i bifogat svarskuvert!**

www.timingstudien.se