

Nationellt vårdprogram Gallstenssjukdom

Föreslagna kvalitetsmått

Kvalitetsvariabel	Målnivå	Går att extrahera från GallRiks
<p>Andel patienter med akut kolecystit som opereras under det akuta slutenvårdstillfället.</p> <p><u>Täljare:</u> samtliga akut inlagda inom slutenvård med huvuddiagnos K80.0, K80.1, K80.4 eller K81.0 med åtgärd JKA20 eller JKA21.</p> <p><u>Nämnare:</u> samtliga akut inlagda inom slutenvård med huvuddiagnos K80.0, K80.1, K80.4 eller K81.0.</p>	70–90 %	Nej
Andel oplanerade återinläggningar inom slutenvård inom 30 dagar efter kolecystektomi.	<5 %	Ja
Andel planerade operationer som genomförs som dagkirurgi hos patienter med ASA ≤2 och okomplicerad gallstenssjukdom. Samma utskrivningsdatum och behandlingsdatum i GallRiks.	80–90 %	Ja
<p>Andel patienter där intraoperativ kolangiografi visar koledokussten som genomgår intraoperativ åtgärd mot dessa (stenfri eller avlastad).</p> <p>Antingen intraoperativ ERCP eller laparoskopisk stenextraktion på samma datum som galloperationen.</p>	>95 %	Ja
Andel gallopererade med genomförd intraoperativ kolangiografi.	>95 %	Ja